

INMUNOMODULADORES	ABLATIVOS	CITOTÓXICOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinecatequinas</li> <li>• Imiquimod</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crioterapia</li> <li>• Láser CO 2</li> <li>• Electrocoagulación</li> <li>• Cirugía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podofilotoxina</li> <li>• Resina de Podofilino</li> <li>• Ácido BI-Tricloroacético</li> <li>• Cantardina</li> </ul>
<b>VENTAJAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disminuyen la replicación viral</li> <li>• Potencian la inmunidad celular</li> <li>• Disminuyen las recurrencias</li> </ul>	<b>VENTAJAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima respuesta inicial</li> </ul>	<b>VENTAJAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respuesta inicial rápida</li> </ul>
<b>INCONVENIENTES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8- 16 semanas de tratamiento</li> </ul>	<b>INCONVENIENTES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• no actúan sobre la actividad viral</li> <li>• no actúan sobre la inmunidad</li> <li>• alta tasa de recurrencia</li> </ul>	<b>INCONVENIENTES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• no actúan sobre la actividad viral</li> <li>• no actúan sobre la inmunidad</li> <li>• alta tasa de recurrencia</li> </ul>
<b>INDICACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrugas que están apareciendo</li> <li>• Verrugas que aumentan su tamaño</li> </ul>	<b>INDICACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrugas estables de meses de evolución</li> </ul>	<b>INDICACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrugas estables de meses de evolución</li> </ul>

